

Lociranje točki za postavljanje mamaca

Komercijalne kuhinje

1. Friteza – Proliveno ulje ili kapljice ulja mogu umanjiti učinkovitost gel mamaca. Mamce bi trebalo postaviti na mjesta na kojima je najmanje vjerojatno da bilo kakvi preparati mogu ugroziti rad. Postavite mamce na mjesta koja su udaljena od prolivenog ulja; u kutove i na ulazne ili izlazne točke poput prekidača.

2. Radne jedinice – Kada se u neposrednoj blizini mamaca nalaze drugi izvori hrane, manje je vjerojatno da će žohari namirisati mamac, zbog čega je pravilno postavljanje mamaca od ključne važnosti. Postavite ih u kutove ili spojeve između jedinica, na podnožja ili u blizini ulaznih, odnosno izlaznih točki poput prekidača.

3. Radne površine – za dugotrajnu kontrolu, mamce bi trebalo postaviti na mjesta na kojima je najmanja vjerojatnost da će ih se ukloniti tijekom uobičajenih procesa čišćenja. Postavite ih s donje strane polica u kutove, odnosno spojeve između jedinica ili na podnožja.

4. Cijevi, vodovi ili električni prekidači – Žohari nerijetko tragaju za hranom unutar električnih instalacija, vodova ili cijevi. Mamce bi trebalo postaviti na njihovim

spojevima i u utičnicama. Osim toga, trebalo bi ih postaviti na bilo kojem mjestu gdje cijevi ili vodovi izlaze iz poda, zida ili stropa.

5. Pohranjivanje hrane – na mjestima gdje se pohranjuje hrana velika je vjerojatnost pojave žohara. Mamce postavite s donje strane polica u blizini kutova ili spojeva.

6. Higijena – dobra higijena u blizini mamaca općenito povećava njihovu učinkovitost tako što eliminira alternativne izvore hrane i vode te povećava mogućnost kontakta između žohara i mamca.

7. Postavljanje – Žohari su uvijek u potrazi za tamnim mjestima, a nerijetko im idealno utočište pružaju kuhinjski aparati. Poželjno je da su mamci postavljeni na ulaznim ili izlaznim točkama, na podnožjima ili u kutovima.

8. Sudoperi – U prostorima gdje se razmnožavaju žohari, sudoperi su uvijek njihovo idealno okruženje. Najbolje je postaviti mamac iza elementa sa sudoperom, oko spojeva cijevi ili ispod sudopera.

Kupaonice u domaćinstvima

1. Kupaonski ormarići – Vrlo je vjerojatno da ćete na mjestima gdje čuvate stvari primijetiti veći broj žohara. Mamce postavite s donje strane polica u blizini kutova ili spojeva.

2. Umivaonici – U prostorima gdje se razmnožavaju žohari, umivaonici su uvijek njihovo idealno okruženje. Najbolje je postaviti mamce oko spojeva cijevi, ispod umivaonika ili iza ogledala.

3. Kade – Žohari vole mirna i skrivena utočišta i uvijek su u potrazi za tamnim mjestima. Stoga, prazan prostor ispod kade može biti idealno mjesto za njihovo gniježđenje. Postavite mamce u kutove prednjeg dijela kade ili na bilo koju drugu ulaznu ili izlaznu točku.

4. Zahodske školjke – Kako bi tretman bio uspješan, mamci moraju biti postavljeni što je bliže moguće skloništu žohara i njihovim uobičajenim rutama kretanja. Postavite mamce na spojeve oko odvodne cijevi ili u praznine iza vodokotlića.

5. Tuš kabine – Cjevovodni sustav između katova žoharima predstavlja korisnu mrežu za opskrbu hranom. Zbog toga ih najčešće nalazimo unutar i oko tuš kabina i njihovih odvodnih cijevi. Mamce bi trebalo postaviti na ulazne i izlazne točke oko tuš kabine i na mjestima gdje iz zida izlaze cijevi.

Mapa za suzbijanje žohara

Uobičajeni uvjeti postavljanja gel mamaca

Lokacija	Broj potrebnih točki*	Geliranje protiv žohara
Kućanstvo – kuhinja	10 - 25	Najbrži i najučinkovitiji način za suzbiti žohare. - Brz i pouzdan tretman s trenutnim rezultatima
Kućanstvo – kupaonica	Do 12	- Lančani efekt za potpunu kontrolu - Nisko doziranje koje jamči kvalitetu i sigurnost
Kućanstvo – ostale prostorije	Do 12	- Precizno postavljanje koje jamči točnost i brzinu
Komercijalne kuhinje **	100 - 300	
Komercijalni barovi/restorani **	60 - 100	

* Uobičajene točke od 0.03 g

** Prosječna veličina (40 - 50 mjesta)

Tretiranje pukotina i procjepa

Čak i dobro organizirano geliranje protiv žohara ponekad je potrebno popratiti komplementarnim tretmanima za pukotine i procjepe.

Mamci s insekticidima niske toksičnosti često su ograničeni lošijim 'lančanim efektom', kao i različitim drugim ograničenjima.

Potpuna kontrola može se postići jedino kada se izlegu sva jajašca i nimfe su se ili razvile toliko da traže hranu ili su konzumirale dovoljno insekticida jedenjem otrovanih jedinki ili njihovog izmeta.

Ovakve poteškoće najlakše je prevladati ciljanim tretiranjem ključnih mjesta gniježđenja žohara s komplementarnim, rezidualnim insekticidom u spreju.

Ovakvi sprejevi koriste se za tretiranje pukotina i procjepa u kombinaciji s mamcima kako bi se ubrzao proces suzbijanja žohara i povećala se njegova učinkovitost. Također se koriste i kao glavna metoda suzbijanja u prostorima gdje postavljanje mamaca ne bi dalo potrebne rezultate.

Kada se koristi kao komplement mamcima, mora se paziti na to da se izbjegne kontaminiranje područja u blizini točki s mamcima.

Prskanje protiv žohara

Iznimno djelotvoran rezidualni insekticid s trenutnim učinkom.

- Dokazano djelotvoran, nisko doziranje
- Izvrstan način suzbijanja velikog broja insekata

- Trenutan učinak i pouzdano rezidualno djelovanje

- Jednostavno, prihvatljivo i sigurno za upotrebu

